




FONDAZIONE
POLICLINICO UNIVERSITARIO
CAMPUS BIO-MEDICO



Informazioni per i pazienti sottoposti alla procedura di Clamping Selettivo del Nervo Simpatico

**FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO
CAMPUS BIO-MEDICO**

www.policlinicocampusbiomedico.it

Informazioni per i pazienti sottoposti a procedura di Clamping Selettivo del Nervo Simpatico



Introduzione

Gentile Signora, gentile Signore questo opuscolo ha lo scopo di fornirle le informazioni necessarie per affrontare con serenità ogni momento del percorso chirurgico. L'organizzazione dei contenuti le permetterà di ottenere le informazioni su dubbi e perplessità, con lo scopo di informarla sui comportamenti corretti da seguire per affrontare al meglio il periodo successivo all'intervento.

Le clips

L'intervento di Clamping del nervo simpatico è una variante più sofisticata e aggiornata della più antica "simpatectomia".

Le clips in **titanio** che le sono state poste sono generalmente da 2 a 4 e non interferiscono (**non "suonano"**) né con i radar di controllo di sicurezza, presenti ad esempio negli aeroporti, né con gli strumentari medico diagnostici (TAC, Radiografie, Risonanze Magnetiche, etc.).




Dopo l'operazione

Dopo l'operazione è importante **muovere subito le spalle e le braccia** con movimenti ampi e circolari per sciogliere i muscoli e prevenire contratture o dolori.

Dal 2° giorno potrà ricominciare gradualmente l'attività sportiva.

Per le 3-4 settimane seguenti all'operazione è normale avvertire (o anche non avvertire) lievi infiammazioni e strane sensazioni fino a dolori localizzati. Essi sono facilmente controllabili con normali **farmaci per il dolore** (veda la lettera di dimissione). È opportuno che lei prenda il farmaco **appena comincia ad avvertire la sensazione di dolore** (per giovare dell'effetto migliore e immediato del farmaco stesso).



I punti

Dopo l'operazione troverà 2/3 ferite con pochi punti riassorbibili.

Dopo 2 giorni potrà fare la doccia. Disinfetti le ferite e rimuova i cerotti (senza rimetterli).

I punti riassorbibili cadranno da soli dopo 3/4 settimane circa, oppure, se preferisce, può farli togliere da un medico dopo 10 giorni.

Le mani

Nelle prime settimane potrebbe avere la sensazione di mani troppo secche. Se lo desidera, può utilizzare "**creme con oli naturali**" (argàn, olive, mandorle, karitè, cocco, etc.) senza parabeni, paraffina o silicone.

Nei primi giorni, può capitare di avere le mani gocciolanti con uno strano sudore, un po' più oleoso del normale. L'effetto è normale e svanirà in poche ore.

Il fumo e il caffè

Il **caffè** e il **fumo** stimolano la sudorazione.



Dopo questa toracoscopia è importante **NON FUMARE** per 2 settimane. Durante questo tipo di interventi capita spesso di trovare i polmoni anneriti nei giovani fumatori e potrebbe essere l'occasione giusta per smettere definitivamente.



non fumatore



fumatore medio



fumatore ostinato



Policlinico Universitario accreditato JCI
Qualità e Sicurezza per i nostri Pazienti

UO CHIRURGIA GENERALE SPECIALISTICA

chirurgiageneralespecialistica@policlinicocampus.it

FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDICO

Via Álvaro del Portillo, 200 - 00128 Roma

Tel. 06.22541.8965

www.policlinicocampusbiomedico.it